Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: al menos 200 L/ha para hortalizas y cultivos extensivos 1000 L/ha (100 galones/acre) para frutas pequeñas y árboles frutales.

12% Ca

Nutriente líquido

Mezcla y aplicación. Agitar bien el envase antes de usar. Llenar tres cuartos del tanque. Encender el agitador y agregar el producto. Enjuagar los recipientes vacíos y añadir el agua de enjuage al tanque. Agregue el resto del agua y póngase sin esperar. Para lograr mejores resultados, póngase por la mañana temprano o al final de la tarde. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Mezcla en tanque. Este producto puede mezclarse en tanque con pesticidas. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilidad. Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Verificar la compatibilidad antes de mezclar en el tanque o consultar al representante. Compruebe la compatibilidad del modo siguiente. En un envase transparente limpio, agregue el agua y los otros productos que se combinarán, uno por uno en la misma proporción que el uso propuesto. Agite suavemente. Deje reposar la mezcla 30 minutos. Si hay incompatibilidad se formarán escamas, lodo, geles u otros precipitados. También, los líquidos pueden separarse. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este fertilizante se debe emplear únicamente de la manera recomendada. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Este producto contiene soja. Pueden producirse reacciones adversas en personas sensibles. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Utilizar una máscara antipolvo y guantes de protección. En caso de reacción alérgica, consulte a un médico. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis
del suelo y/o de los tejidos vegetales.

Garantía. La garantía del vendedor se limita a los términos de esta etiqueta. El cliente
es responsable de todos los riesgos y daños físicos y materiales resultantes del uso de
este producto. El cliente acepta las condiciones estipuladas.

Análisis mínimo garantizado

Calcio (Ca) 12 % Aminoácidos 2,5 % Ácido cítrico 0,4 %

Dosis galón US/acre Aplicación foliar

Dosis L/ha

Cultivos Momento de aplicación y observaciones

Apio 3-6 0,3-0,6 Aplíquese cuando la planta tenga 20 cm (8”). Repítase

cada 7 días.

Calabaza, pepino,

melón, cantalupo 3-6 0,3-0,6 Cuando hayan granado. Repítase cada 15 días.

Crucíferas 3-6 0,3-0,6 A partir de la subida.

Fresa, frambuesa,

arándano, arándano rojo 4-9 0,4-1,0

A partir de la floración. Tres aplicaciones cada 10 días.
Para las fresas que suben, háganse 6 aplicaciones.
Repetir 15 días después.

Fruto de hueso 5 0,5 Aplicar en la fase de brote blanco. Repetir a intervalos de

10-14 días.

Lechuga, espinacas 3-6 0,3-0,6 A partir de la fase de 6 hojas. Empezar antes de la

formación de cabezas. Repítase cada 7 días.

Manzana, pera 10 1,1

Aplicar 4 veces a los 10-14 días a partir de la caída de los
pétalos. Para reducir el corazón amargo en las variedades
sensibles, aplicar a partir de la fase de los capullos verde.
No se recomienda la aplicación en las variedades
sensibles a los cloruros.

Papa 2,5-6 0,3-0,6 A partir de la floración. Repetir a los 14 días o a la

aparición de la carencia.

Plantas ornamentales 1-2 0,1-0,2 En el campo, aplicar de 2 a 3 L/ha, según sea necesario;

en invernadero, poner 50 ml en 10 L y pulverizar.

Tomate, pimiento,

berenjena 3-6 0,3-0,6 Formación de los primeros frutos. Repítase cada 7-10 días.

Viña 7,5 0,8

Primera aplicación entre la prefloración y la floración.
Repetir en el momento del cuajado, durante la formación
completa del racimo y durante el envero.

Zanahoria 3-6 0,3-0,6 Aplíquese cuando la planta tenga 10-15 cm (4-6”) de altura.

Aplicación en el suelo

Consulte a su asesor agronómico sobre la dosis adecuada para sus condiciones.

2026_04

Pür Cal es un nutriente líquido pensado para

prevenir y tratar las carencias de calcio. El alto nivel

de calcio mejora la resistencia de las paredes

celulares y la calidad de la fruta (menos sensible

a la mancha amarga y a la podredumbre apical).

Pür Cal contiene aminoácidos obtenidos por

hidrólisis enzimática que estimulan los procesos

fisiológicos de la planta, absorción y movilidad

de nutrientes en la planta así como establecer

mecanismos de resistencia frente a estreses

abióticos (temperaturas extremas, falta o exceso

de agua, salinidad, productos agroquimicos, etc.).

Pür Cal puede aplicarse a todos los cultivos. Este

producto sólo debe utilizarse sobre la base de un

análisis de suelo y/o tejido. Para más información

sobre Pür Cal, consulte a su asesor agronómico.

beneficios agronómicos

l Reducción de muchos trastornos fisiológicos

l Mejor calidad de las frutas y hortalizas

l Mejor conservación de frutas y hortalizas

l Disminuye las lesiones en los cultivos causadas

por la maquinaria

l Resistencia frente a enfermedades

densidad 1,343 kg/L instrucciones de uso

Pour l’utilisation biologique • OMRI.org

Approuvé pour l'agriculture biologique par Ecocert Canada
Approved for organic agriculture by Ecocert Canada

Pür Ca

1 866 770.8887 • www.agro-100.com