

# Agro-Ammo

TM/MC

## 8-0-0 + 9% S

### Nutriment liquide / Liquid Nutrient / Nutriente líquido



#### ATTENTION

**Provoque une irritation cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.**

**Prévention:** Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage.

**Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et s'ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: demander un avis médical. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche et la gorge avec de grandes quantités d'eau. Ne pas faire vomir. EN CAS D'INHALATION: déplacer la victime à l'air frais et la maintenir à l'aise pour respirer. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

**Stockage:** Garder sous clef.

**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

**NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**



versión  
en español  
en el interior

#### WARNING

**Causes skin irritation.  
Causes serious eye irritation.**

**Prevention:** Wash hands thoroughly after handling and any other part of the body that may have been exposed to the product. Wear protective gloves, protective clothing, eye and face protection.

**Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. IF SWALLOWED: Rinse mouth and throat with copious amounts of water. Do not induce vomiting. IF INHALED: Move victim to fresh air and keep comfortable for breathing. Seek medical attention if irritation persists.

**Storage:** Store locked up.

**Disposal:** Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations in force.

**DO NOT REUSE CONTAINER  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Fabricant • Manufacturer • Fabricante  
Agro-100 Itée, 990, chemin des Prairies,  
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4  
T 450 759-8887 • www.agro-100.com



**Mélange et application.** Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer sous des conditions desséchantes et lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

**Mélange en réservoir.** Dans certains cas, le mélange en réservoir avec des produits antiparasitaires peut entraîner des incompatibilités physiques et chimiques qui peuvent avoir une incidence sur l'efficacité des produits et le rendement des cultures. Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette des fabricants de mélange en réservoir. Consulter les représentants des fabricants de pesticides et un représentant d'Agro-100 afin de déterminer la sécurité et les résultats agronomiques du mélange.

**Mixing and application.** Shake well before using. Fill the tank three quarters full. Start agitation and add product. Clean the empty containers and add the rinsing water to the tank. Add the rest of the water and apply without delay. For best results, apply early in the morning or late in the evening. Do not apply under drying conditions and when outside temperature is too high otherwise culture may be damaged.

**Tank mixing.** In some cases, tank mixing with pest control products can result in physical and chemical incompatibilities which may impact the efficacy of the products and the crop performance. Always read and follow label directions of the tank mix partners. Consult the pesticides manufacturer representatives and an Agro-100 representative to help determine the safety and agronomic outcome of the mix.

**Mezcla y aplicación.** Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

**Mezcla en tanque.** En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

**Compatibilité.** Ce produit est compatible avec la plupart des produits agrochimiques. Ne pas utiliser Agro-Ammo avec des pulvérisations à base d'huile. Lire attentivement les étiquettes des autres produits pour se familiariser avec le mode d'emploi des traitements qui contiennent de l'huile et des oligoéléments qui contiennent du soufre. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

**Entreposage.** Grait le gel.

**Compatibility.** This product is compatible with most agrochemical products. Do not apply Agro-Ammo with oil sprays. Be sure to check other manufacturer's labels concerning oil treatment spray guidelines and foliar nutrient applications containing sulphur. **Check compatibility as follow.** In a clean, transparent jar, add the water and other products, one by one in the same proportion as proposed application. Agitate gently. Let the jar sit for 30 minutes. Incompatible products will form flakes, sludge, gels or other precipitates. Separation or layering may appear. Do not apply in case of incompatibility.

**Storage.** Avoid freezing.

**Compatibilidad.** Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. No debe utilizarse Agro-Ammo con pulverizaciones a base de aceite. Lea atentamente las etiquetas de los otros productos para familiarizarse con el modo de empleo de los tratamientos que contienen aceite y de los oligoelementos que contienen azufre. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

**Almacenamiento.** Evitar la congelación.

**Avertissement.** Cet engrais ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé. Les traitements foliaires n'apportent aux plantes qu'une fraction des nutriments nécessaires à une bonne production. Ce produit doit être utilisé comme complément à un programme de fertilisation de base établi en fonction d'analyses de sol ou de tissus végétaux.

**Garantie.** La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.

**Caution.** This fertilizer must be used only as recommended. It may prove harmful when misused. Foliar treatments supply plants with only a fraction of the nutrients required to any good production. This product must be used as complement to a soil fertilization program based on soil or plant tissue analyses.

**Guarantee.** The vendor's liability will be limited to the terms of this label. The buyer will then be responsible for all risks and damages to persons or properties resulting from the use of this product, and hereby accepts these conditions.

**Advertencia.** Este fertilizante se debe emplear únicamente de la manera recomendada. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Los tratamientos foliares sólo aportan a las plantas una parte de los nutrientes necesarios para una buena producción. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.

**Garantía.** La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

## ATENCIÓN

**Provoca irritación cutánea.  
Provoca irritación ocular grave.**



**Prevención:** Lávese bien las manos después de la manipulación y cualquier otra parte del cuerpo que pueda haber estado expuesta al producto. Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara.

**Intervención:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca y la garganta con abundante agua. No induzca el vómito. EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la víctima al aire libre y manténgala cómoda para respirar. Busque atención médica si la irritación persiste.

**Almacenamiento:** Guardar bajo llave.

**Eliminación:** Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

NO REUTILICE EL CONTENEDOR  
MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# Agro-Ammo<sup>TM/MC</sup>

## 8-0-0 + 9 % S

**Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre) pour les grandes cultures et maraichères, 1000 L/ha (100 gallons/acre) pour les petits fruits et arbres fruitiers.**

**Agro-Ammo** est un nutriment liquide qui contient de l'azote et du soufre. **Agro-Ammo** stimule la croissance et restaure la vigueur de la plante. Il est indiqué pour toutes les cultures et il doit être appliqué sur la base d'analyses de sol ou de tissus ou à l'apparition de symptômes de carences. Pour une meilleure utilisation de l'azote et du soufre par la plante, appliquer **Agro-Ammo** avec une solution d'azote selon un ratio N:S adéquat de 5:1. Pour plus d'information sur **Agro-Ammo**, consultez votre conseiller agronomique.

### Analyse minimale garantie

Azote total (N)	8 %
8 % azote hydrosoluble	
Soufre (S)	9 %

Dose gallon US/acre			Application foliaire	
Dose L/ha			Moment d'application et remarques	
Cultures				
Blé, orge, avoine	5-10	0,5-1,1	4	Au tallage, répéter à la floraison pour augmenter le taux de protéines.
Bleuet, canneberge	3-5	0,3-0,5	4	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Brocoli, chou, chou-fleur	5-10	0,5-1,1	4	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à la formation de la tête.
Canola, moutarde	10	1,1	4	Au stade élongation de la tige. Répéter à la chute des pétales.
Carotte	3-6	0,3-0,6	4	2 ou 3 semaines après émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Céleri, laitue, épinard	3-5	0,3-0,5	4	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Concombre, courge, melon, cantaloup	3-5	0,3-0,5	4	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Cultures fourragères	5-10	0,5-1,1	4	Après chaque coupe.
Fraise, framboise	3-5	0,3-0,5	4	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Maïs sucré, maïs grain	5-10	0,5-1,1	4	Stade 6-8 feuilles, répéter plus tard au besoin.
Oignon	5-10	0,5-1,1	4	2 ou 3 semaines après émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Pomme, poire	4-6	0,4-0,6	4	Entre la préfloraison et le stade calice, répéter 10 jours après la chute des pétales. Ne pas appliquer plus tard qu'en juillet car la qualité des fruits et la survie hivernale pourraient être affectées. Ne pas appliquer plus de trois fois.
Pomme de terre	5-10	0,5-1,1	4	2 ou 3 semaines après émergence, répéter juste avant la floraison au besoin. Ne pas appliquer tardivement.
Soya, haricot, pois	5-7,5	0,5-0,8	4	Stade 2 ou 3 feuilles trifoliées, répéter plus tard au besoin.
Tomate, poivron, aubergine	3-5	0,3-0,5	4	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à la floraison.
Vigne	3-5	0,3-0,5	4	Lorsque les pousses ont entre 10-20 cm (4-8") et 30-40 cm (12-16") de longueur et à la véraison. Répéter à la véraison.

### Application au sol

Consultez votre conseiller agronomique pour un dosage adapté à vos conditions.

# Agro-Ammo™/MC

## 8-0-0 + 9% S

**Apply at suggested rates. Water volume: at least 200 L/ha (21.5 gallons/acre) for arable and vegetable crops, 1000 L/ha (100 gallons/acre) for small fruits and fruit trees.**

**Agro-Ammo** is a liquid nutrient that contains nitrogen and sulphur. **Agro-Ammo** stimulates growth and restores plant vigour. It is indicated for every crop and it must be applied based on soil or tissue analyses or as soon as deficiency symptoms appear. So that the plant makes better use of the nitrogen and sulphur, apply **Agro-Ammo** with a nitrogen solution to provide an adequate N:S ratio of 5:1. For more information on **Agro-Ammo**, consult your agronomic adviser.

### Guaranteed minimum analysis

Total nitrogen (N)	<b>8%</b>
8% water soluble nitrogen	
Sulphur (S)	<b>9%</b>

Rate US gallon/acre			Foliar application	
Rate L/ha			Application timing and remarks	
Crops				
Apple, pear	4-6	0.4-0.6	0.4-0.6	Between pre-flowering and calyx stages, repeat 10 days after petals fall out. Do not apply later than July because fruit quality and winter survival of the tree could be affected. Do not apply more than three times.
Blueberry, cranberry	3-5	0.3-0.5	0.3-0.5	After leaf emergence, repeat 14 days later if needed.
Broccoli, cabbage, cauliflower	5-10	0.5-1.1	0.5-1.1	Between 7 and 14 days after transplanting, repeat at head formation.
Canola, mustard	10	1.1	1.1	At the stem elongation stage. Repeat at petal fall.
Carrot	3-6	0.3-0.6	0.3-0.6	2 or 3 weeks after emergence, repeat 14 days later if needed.
Celery, lettuce, spinach	3-5	0.3-0.5	0.3-0.5	Between 7 and 14 days after transplanting, repeat at 14-day intervals if needed.
Cucumber, squash, melon, cantaloupe	3-5	0.3-0.5	0.3-0.5	Between 7 and 14 days after transplanting, repeat at 14-day intervals if needed.
Forage	5-10	0.5-1.1	0.5-1.1	After each cut.
Onion	5-10	0.5-1.1	0.5-1.1	2 or 3 weeks after emergence, repeat 14 days later if needed.
Potato	5-10	0.5-1.1	0.5-1.1	2 or 3 weeks after emergence, repeat just before flowering if needed. Do not apply late.
Soybean, bean, pea	5-7.5	0.5-0.8	0.5-0.8	2- or 3-trifoliate leaf stages, repeat later if needed.
Strawberry, raspberry	3-5	0.3-0.5	0.3-0.5	After leaf emergence, repeat 14 days later if needed.
Sweet corn, grain corn	5-10	0.5-1.1	0.5-1.1	6- to 8-leaf stages, repeat later if needed.
Tomato, pepper, eggplant	3-5	0.3-0.5	0.3-0.5	Between 7 and 14 days after transplanting, repeat at flowering.
Vine	3-5	0.3-0.5	0.3-0.5	When shoots are between 10-20 cm (4-8") and 30-40 cm (12-16") long and at veraison. Repeat at veraison.
Wheat, barley, oats	5-10	0.5-1.1	0.5-1.1	At tillering, repeat at flowering to increase protein rate.

### Soil application

Consult your agronomic adviser for the appropriate dosage for your conditions.

# Agro-Ammo™/MC

## 8-0-0 + 9% S

**Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre) para los grandes cultivos y huertos, 1.000 L/ha (100 galones/acre) para los frutos pequeños y los árboles frutales.**

**Agro-Ammo** es un nutriente líquido que contiene nitrógeno y azufre. **Agro-Ammo** estimula el crecimiento y restaura el vigor de la planta. Está indicado para todo cultivo y debe ser aplicado a partir del análisis del suelo o de los tejidos o de la aparición de síntomas de carencias. Para un mejor uso del nitrógeno y del azufre en la planta, aplicar **Agro-Ammo** con una disolución de nitrógeno en una proporción N:S adecuada de 5:1. Para más información sobre **Agro-Ammo**, consulte a su asesor agronómico.

### Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N)	8 %
8 % nitrógeno soluble en agua	
Azufre (S)	9 %

Dosis galón US/acre			Aplicación foliar
Dosis L/ha			
Cultivos			Momento de aplicación y observaciones
Apio, lechuga, espinacas	3-5	0,3-0,5	Entre 7 y 14 días después del trasplante; repetir con un intervalo de 14 días, de ser necesario.
Arándano, arándano rojo	3-5	0,3-0,5	Después de la aparición de las hojas; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.
Brócoli, col, coliflor	5-10	0,5-1,1	Entre 7 y 14 días después del trasplante; repetir cuando se forme la cabeza.
Cebolla	5-10	0,5-1,1	2 o 3 semanas después de surgir; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.
Colza, mostaza	10	1,1	En las fases de alargamiento del tallo. Repetir a la caída de los pétalos.
Cultivos forrajeros	5-10	0,5-1,1	Después de cada corte.
Fresa, frambuesa	3-5	0,3-0,5	Después de la aparición de las hojas; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.
Maíz dulce, maíz en grano	5-10	0,5-1,1	Estadio de 6 a 8 hojas; repetir posteriormente de ser necesario.
Manzana, pera	4-6	0,4-0,6	Entre la prefloración y el estadio cáliz; repetir 10 días después de la caída de los pétalos. No aplicar después del mes de julio para no perjudicar la calidad de los frutos y la supervivencia invernal. No aplicar más de tres veces.
Papa	5-10	0,5-1,1	2 o 3 semanas después de surgir; repetir justo antes de la floración de ser necesario. No aplicar tardíamente.
Pepino, calabaza, melón, cantalupo	3-5	0,3-0,5	Entre 7 y 14 días después del trasplante; repetir con un intervalo de 14 días, de ser necesario.
Soya, frijol, chícharo	5-7,5	0,5-0,8	Estadio de 2 a 3 hojas trifoliadas; repetir posteriormente de ser necesario.
Tomate, pimiento, berenjena	3-5	0,3-0,5	Entre 7 y 14 días después del trasplante; repetir en la floración.
Trigo, cebada, avena	5-10	0,5-1,1	En el amacollamiento; repetir en la floración para incrementar la tasa de proteínas.
Viña	3-5	0,3-0,5	Cuando los brotes tienen 10-20 cm (4-8") y 30-40 cm (12-16") de longitud y en el envero. Repetir en el envero.
Zanahoria	3-6	0,3-0,6	2 o 3 semanas después de surgir; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.

### Aplicación en el suelo

Consulte a su asesor agronómico sobre la dosis adecuada para sus condiciones.