



Intrant
approuvé pour
l'agriculture

Input approved
for organic
agriculture

Approuvé pour l'agriculture biologique par Ecocert Canada
Approved for organic agriculture by Ecocert Canada



Pür Mag



5% S+ 4% Mg

Nutriente líquido

Agro 100

cultivando la **innovación**

Pür Mag es un nutriente líquido pensado para de prevenir y tratar las carencias de magnesio, elemento indispensable para la fotosíntesis y otros procesos metabólicos de la planta. **Pür Mag** contiene aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática que estimulan los procesos fisiológicos de la planta, absorción y movilidad de nutrientes en la planta así como establecer mecanismos de resistencia frente a estreses abióticos (temperaturas extremas, falta o exceso de agua, salinidad, productos agroquímicos, etc.). **Pür Mag** puede aplicarse a todos los cultivos. Este producto sólo debe utilizarse sobre la base de un análisis de suelo y/o tejido. Para más información sobre **Pür Mag**, consulte a su asesor agrónomo.

beneficios agronómicos

- Necesario para la síntesis de clorofila y fotosíntesis
- Más energía en la planta
- Síntesis y transporte de azúcares, proteínas y lípidos
- Estabilización de las membranas celulares
- Calidad del tubérculo de la patata
- Resistencia al estrés ambiental

densidad **1,210 kg/L**

Análisis mínimo garantizado

Azufre (S)	5 %
Magnesio (Mg)	4 %

Aminoácidos	2,5 %
-------------	-------

Dosis galón US/acre			Aplicación foliar	
Dosis L/ha			Momento de aplicación y observaciones	
Cultivos				
Apio, lechuga, espinacas	2-5	0,2-0,5	7 días después de plantar; repetir a intervalos de 14 días, de ser necesario.	
Arándano, arándano rojo	4	0,4	10 días después de la caída de los pétalos.	
Betabel	4	0,4	En la etapa de 4 a 6 hojas.	
Brócoli, col, coliflor	2-5	0,2-0,5	7 días después de trasplantar; repetir a intervalos de 14 días, de ser necesario.	
Calabaza, pepino, melón, cantalupo	2-5	0,2-0,5	7 días después de trasplantar; repetir después de la floración.	
Cebolla	2-4	0,2-0,4	2 semanas después de surgir.	
Frambuesa	2-4	0,2-0,4	Al inicio de la floración.	
Fresa	2-4	0,2-0,4	Botón verde.	
Fruto de hueso	5	0,5	En la emergencia de la hoja completa y repetir durante el desarrollo del fruto y 3-4 semanas antes de la caída de las hojas.	
Maíz dulce, trigo, cebada, avena	2-4	0,2-0,4	Entre el estadio de 2 hojas y el final del amacollamiento.	
Manzana, pera	4-6	0,4-0,6	Yema rosada y fructificación. En caso de deficiencia seria, repetir durante el desarrollo del fruto.	
Papa	2-4	0,2-0,4	Entre 1 y 4 semanas después de la aparición completa. Para aumentar la materia seca del tubérculo, aplicar también mientras engordan los tubérculos.	
Pasto	5-15	0,5-1,6	A partir de que comienza el crecimiento en la primavera y repetir a intervalos de 3-4 semanas.	
Soya, frijol	2-4	0,2-0,4	La planta de 10 a 15 cm (4" a 6") de altura.	
Tomate, pimiento, berenjena	2-4	0,2-0,4	7 días después de plantar; repetir en la floración.	
Viña	2-4	0,2-0,4	En las etapas de yemas florales visibles, de separación de yemas florales y de cuajado.	
Zanahoria	2-4	0,2-0,4	La planta de 15 cm (6") de altura.	

Aplicación en el suelo

Consulte a su asesor agrónomo sobre la dosis adecuada para sus condiciones.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre) para los grandes cultivos y huertos, 1.000 L/ha (100 galones/acre) para los frutos pequeños y los árboles frutales.

instrucciones de uso

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Mezcla en tanque. Este producto puede mezclarse en tanque con pesticidas. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, excepto fertilizantes fosfatados. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este fertilizante se debe usar solo como se recomienda. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Este producto contiene soja. Pueden producirse reacciones adversas en personas sensibles. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Utilizar una máscara antipolvo y guantes de protección. En caso de reacción alérgica, consulte a un médico. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

1 866 770.8887 • www.agro-100.com