



Approuvé pour l'agriculture biologique par Ecocert Canada  
Approved for organic agriculture by Ecocert Canada



cultivando la **innovación**

**Pür Zn** es un nutriente líquido pensado para aplicar en las hojas y en el suelo para prevenir y tratar las carencias de zinc. **Pür Zn** contiene aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática que estimulan los procesos fisiológicos de la planta, absorción y movilidad de nutrientes en la planta así como establecer mecanismos de resistencia frente a estreses abióticos (temperaturas extremas, falta o exceso de agua, salinidad, productos agroquímicos, etc.). El zinc se asocia con los ácidos carboxílicos, lo cual le permite ser totalmente asimilable y desplazarse mejor en los tejidos de la planta. El zinc es un elemento fundamental en la síntesis de las hormonas (auxinas), el funcionamiento de las enzimas y la síntesis de las proteínas. **Pür Zn** puede aplicarse a todos los cultivos. Este producto sólo debe utilizarse sobre la base de un análisis de suelo y/o tejido. Para más información sobre **Pür Zn**, consulte a su asesor agrónomo.

## beneficios agronómicos

- Estimulación del crecimiento y la madurez
- Corrección rápida de las deficiencias
- Mejor brotación en frutales
- Asimilación del calcio y otros elementos
- Resistencia al estrés
- Rendimiento y calidad sostenidos

densidad **1,380 kg/L**

**4.5% S+ 9% Zn**

**Nutriente líquido**



### Análisis mínimo garantizado

|                  |       |               |       |
|------------------|-------|---------------|-------|
| Azufre (S)       | 4,5 % | Aminoácidos   | 2,5 % |
| Zinc (Zn) (real) | 9 %   | Ácido cítrico | 0,5 % |

| Dosis galón US/acre     |       |         | Aplicación foliar                                                                                  |  |
|-------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dosis L/ha              |       |         | Momento de aplicación y observaciones                                                              |  |
| Cultivos                |       |         |                                                                                                    |  |
| Arándano, arándano rojo | 2,5-5 | 0,3-0,5 | Al principio del cuajado y 3-4 semanas antes de la caída de las hojas.                             |  |
| Cebolla, puerro         | 2-5   | 0,2-0,5 | Estadio de 2 a 5 hojas.                                                                            |  |
| Fresa (en el campo)     | 3     | 0,3     | Estadios de los capullos verde/blancos y 3-4 semanas antes de la caída de las hojas.               |  |
| Fruto de hueso          | 2,5-5 | 0,3-0,5 | Aplicar en el brote de invierno o en el brote rosado y 3-4 semanas antes de la caída de las hojas. |  |
| Lechuga, espinacas      | 2-5   | 0,2-0,5 | Estadio de 2 a 5 hojas.                                                                            |  |
| Maíz                    | 5     | 0,5     | Estadio de 4 a 8 hojas.                                                                            |  |
| Manzana, pera           | 3-6   | 0,3-0,6 | Desborre y 3-4 semanas antes de la caída de las hojas.                                             |  |
| Papa                    | 5     | 0,5     | Entre una semana después de la aparición y la floración.                                           |  |
| Soya, frijol, chícharo  | 2-4   | 0,2-0,4 | En el estadio de 5 a 15 cm.                                                                        |  |
| Tomate (en el campo)    | 2,5-5 | 0,3-0,5 | En los estadios de 4 a 6 hojas.                                                                    |  |
| Trigo, cebada, avena    | 2,5-5 | 0,3-0,5 | Desde el estadio de 2 hojas hasta el estadio del primer nudo visible.                              |  |
| Viña                    | 2,5-5 | 0,3-0,5 | Estadios de racimos visibles a capullos florales separados.                                        |  |

### Aplicación en el suelo

Consulte a su asesor agrónomo sobre la dosis adecuada para sus condiciones.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).

## instrucciones de uso

**Mezcla y aplicación.** Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

**Mezcla en tanque.** Este producto puede mezclarse en tanque con pesticidas. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

**Compatibilidad.** Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

**Almacenamiento.** Evitar la congelación.

**Advertencia.** Este fertilizante contiene zinc y debe usarse solo como se recomienda. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Este producto contiene soja. Pueden producirse reacciones adversas en personas sensibles. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Utilizar una máscara antipolvo y guantes de protección. En caso de reacción alérgica, consulte a un médico. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.

**Garantía.** La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

1 866 770.8887 • [www.agro-100.com](http://www.agro-100.com)