



Intrant
approuvé pour
l'agriculture

Input approved
for organic
agriculture

Approuvé pour l'agriculture biologique par Ecocert Canada
Approved for organic agriculture by Ecocert Canada



Pür Fe est un nutriment liquide conçu pour prévenir et traiter les carences en fer. Le fer est indispensable pour la respiration, la formation des chlorophylles, la photosynthèse et l'assimilation de l'azote (formation des protéines). **Pür Fe** contient des acides aminés obtenus par hydrolyse enzymatique qui stimulent les processus physiologiques de la plante, l'absorption et la mobilité des nutriments dans la plante, ainsi que la mise en place des mécanismes de résistance aux stress abiotiques (températures extrêmes, manque ou excès d'eau, salinité, produits agrochimiques, etc.). **Pür Fe** peut être appliqué sur toutes les cultures. Ce produit doit être utilisé en fonction des résultats des analyses de sol et/ou de tissus. Pour plus d'information sur **Pür Fe**, consulter votre conseiller agronomique.

avantages agronomiques

- Efficacité et rapidité d'action
- Effet reverdissant rapide
- Meilleure utilisation de l'azote
- Rendement sécurisé
- Productions de qualité supérieure

densité **1,140 kg/L**

2.5% S+ 5% Fe

Nutriment liquide



Analyse minimale garantie

Soufre (S)	2,5 %	Acides aminés	2,5 %
Fer (Fe) (réel)	5 %	Acide citrique	1,8 %

Dose gallon US/acre			Application foliaire
Dose L/ha			
Cultures			Moment d'application et remarques
Blé, orge, avoine	1-2	0,1-0,2	Au tallage.
Bleuet, canneberge	1-2	0,1-0,2	À la reprise de la végétation.
Crucifères	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Cultures fourragères	0,5-1,5	0,05-0,2	Avant la floraison.
Fraise	1-2	0,1-0,2	À la reprise de la végétation.
Laitue, épinard	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Oignon, poireau	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Pêche, prune, nectarine	2	0,2	Après la floraison, répéter 14 jours plus tard.
Pelouse	70 mL/100 m ²	2,3 oz/1000 pi ²	À la reprise de la végétation, diluer dans un minimum de 10 L (2,5 gallons US) d'eau.
Pomme, poire	2	0,2	Avant et après la floraison. Sur les variétés sensibles au russeting retarder les applications jusqu'à 6 semaines après la chute des pétales.
Tomate (plein champ)	1,5-3	0,2-0,3	Stade de 4-6 feuilles.
Vigne	1,5-3	0,2-0,3	À la reprise de la végétation (3 feuilles).

Répéter aux 10 à 14 jours, au besoin; 3 à 4 fois pendant la saison. Ne pas faire plus de 2 applications quand 7 L/ha (2,3 oz/1000 pi²) de Pür Fe sont utilisés sauf sur recommandation d'un conseiller agronomique. Ne pas appliquer en floraison.

Application au sol

Consultez votre conseiller agronomique pour un dosage adapté à vos conditions.

Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre) pour les grandes cultures et au moins 300 L/ha (32 gallons/acre) pour les cultures horticoles.

mode d'emploi

Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer sous des conditions desséchantes et lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Mélange en réservoir. Ce produit peut être mélangé en cuve avec des pesticides. Dans certains cas, le mélange en réservoir avec des produits antiparasitaires peut entraîner des incompatibilités physiques et chimiques qui peuvent avoir une incidence sur l'efficacité des produits et le rendement des cultures. Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette des fabricants de mélange en réservoir. Consulter les représentants des fabricants de pesticides et un représentant d'Agro-100 afin de déterminer la sécurité et les résultats agronomiques du mélange.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec la plupart des produits agrochimiques. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre conseiller.

Vérifier la compatibilité de la façon suivante. Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Entreposage. Craint le gel.

Avertissement. Cet engrais renferme du fer et il doit être utilisé uniquement tel que recommandé. Il peut être nocif s'il est mal utilisé. Ce produit contient du soja. Des effets indésirables peuvent survenir chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau. Porter un masque antipoussières et des gants de protection. Si une réaction allergique survient, consulter un médecin. Ce produit doit être utilisé comme complément à un programme de fertilisation de base établi en fonction d'analyses de sol ou de tissus végétaux.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.