ACTIVÉ PAR/ACTIVATED BY/ACTIVADO POR

Oligo Prime®

Special K®

0–0–24 + 1% B

Nutriente líquido



Agro 100®

cultivando la innovación

Special K es un nutriente líquido diseñado para prevenir y tratar las carencias de potasio. Se fabrica a partir de carbonato de potasio, ya que es una fuente de potasio sin cloro, lo que lo hace adecuado para su aplicación sobre las plantas y muy apropiado para la aplicación foliar. **Special K** está activado por **la innovadora tecnología de bioestimulantes Oligo Prime®** que permite la absorción rápida y la translocación de los nutrientes, y refuerza las defensas naturales de las plantas contra los estreses abióticos (sequía, baja temperatura, salinidad, etc.). Debe aplicarse en función de los análisis de suelo o de tejidos, o ante la aparición de síntomas de carencia. Para más información sobre **Special K**, consulte a su asesor agronómico.

beneficios agronómicos

- Mejora la forma, la formación de yemas fructíferas, la uniformidad, la firmeza del fruto y el uso del agua
- Aumenta la calidad del fruto (sabores, valor Brix)
- Previene las enfermedades y los trastornos fisiológicos
- Aumenta la resistencia contra diferentes tipos de estrés (heladas y altas temperaturas)
- Acción positiva sobre la coloración de los frutos y las flores
- Formación y transporte de azúcares
- Mejor solubilidad sobre el follaje

densidad **1,380 kg/L**

Análisis mínimo garantizado

Potasio soluble (K_2O)	**24 %**	Extracto de corteza de sauce	**0,1 %**
Boro (B) (real)	**1 %**	Ácido fúlvico (derivado de la leonardita)	**0,12 %**
		Quitosano	**0,1 %**
		Sustancias húmicas (derivadas de la leonardita)	**0,03 %**

Dosis galón US/acre **Dosis** L/ha **Cultivos**			**Aplicación foliar** **Momento de aplicación y observaciones**
Árboles frutales, frutos pequeños	**2,5-10**	**0,3-1,1**	30-40 días antes de la cosecha, repetir 14 días después si es necesario.
Cultivos forrajeros	**2,5-5**	**0,3-0,5**	Al reanudarse la vegetación en primavera y después de cada corte.
Grandes cultivos	**2-5**	**0,2-0,5**	Etapas de 4-8 hojas, repetir a intervalos de 10-14 días si es necesario.
Grandes cultivos + fungicidas	**2**	**0,2**	Al momento de la aplicación del fungicida.
Hortalizas	**2,5-5**	**0,3-0,5**	20-30 días antes de la cosecha.
Papa	**2,5-5**	**0,3-0,5**	En la floración y repetir 14 días después.
Viña	**2,5-10**	**0,3-1,1**	En el envero, repetir a intervalos de 10-14 días si es necesario.

> **Para los cultivos hortícolas y frutales**, utilizar a una concentración máxima del 1 % de la solución (por ejemplo, una dosis de 5 L/ha debería aplicarse en un mínimo de 500 L de agua/ha)

> **Para los grandes cultivos**, utilizar a una concentración máxima del 2 % de la solución (por ejemplo, una dosis de 2 L/ha debería aplicarse en un mínimo de 100 L de agua/ha)

Aplicación en el suelo

Consulte a su asesor agronómico sobre la dosis adecuada para sus condiciones.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre) para los grandes cultivos y por lo menos 300 L/ha (32 galones/acre) para los cultivos hortícolas.

modo de empleo

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Mezcla en tanque. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, excepto los fosfatos. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su asesor. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente**: en un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Dejar reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles producirán una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No aplicar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este fertilizante contiene boro y debe utilizarse únicamente según lo recomendado. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización establecido con arreglo a los análisis del suelo o de los tejidos vegetales. Este producto contiene mariscos. Pueden producirse reacciones adversas en personas sensibles. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Utilizar una máscara antipolvo y guantes de protección. En caso de reacción alérgica, consulte a un médico.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

1 866 770.8887 • www.agro-100.com